

Metricina®

Antibiótico

Metricina®, Comprimido oral, está indicado para el tratamiento de afecciones buco dentales (gingivitis, estomatitis y periodontitis) en perros, causadas por bacterias susceptibles a la asociación, tales como Moraxella spp., Bacteroides spp., Porphyromonas (Bacteroides) asaccharolyticus, Peptostreptococcus spp., Espiroquetas patógenas orales y Treponema spp.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Comprimidos.

Acción terapéutica

Antibiótico.

Composición

Cada comprimido contiene:

Metronidazol.....125 mg

Espiramicina.....750.000 U.I.

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

Indicaciones de uso

Metricina®, Comprimido oral, está indicado para el tratamiento de afecciones buco dentales (gingivitis, estomatitis y periodontitis) en perros, causadas por bacterias susceptibles a la asociación, tales como Moraxella spp., Bacteroides spp., Porphyromonas (Bacteroides) asaccharolyticus, Peptostreptococcus spp., Espiroquetas patógenas orales y Treponema spp.

Dosis

- Dosis de los principios activos: 12,5 mg de Metronidazol y 75.000 U.I. de Espiramicina por kilo de peso, una vez al día, durante 7 a 10 días.
- Dosis del producto: Un comprimido por cada 10 kilos de peso, una vez al día, durante 7 a 10 días.

Vía de administración y modo de empleo

Vía oral.

Administrar junto con el alimento o directamente en la boca del animal.

Especies de destino

Perros.

Efectos adversos y reacciones adversas

- Luego de la terapia con la asociación Espiramicina – Metronidazol en perros, se han reportado casos de ablandamiento de las heces y diarrea.
- La administración del producto Metricina®, Comprimido oral, en la dosis y duración del tratamiento recomendadas, no generó alteraciones clínicas o de laboratorio en los perros tratados, no observándose cambios en el estado de salud de los animales atribuidas al producto.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Usar con precaución en animales con disfunción hepática y/o renal.
 - En caso de periodontitis la terapia debe asociarse a un destartraje dental.
-

Interacciones

- El Metronidazol interactúa con Cimetidina. El metabolismo hepático del Metronidazol se ve disminuido cuando se administran ambos fármacos de manera conjunta.
 - El Fenobarbital puede inducir enzimas microsomales hepáticas, aumentando el metabolismo del Metronidazol, resultando en menor vida media y concentraciones plasmáticas.
 - El efecto de los macrólidos puede ser antagónico al ser utilizados en conjunto con Cloranfenicol o lincosamidas.
 - No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.
-

Contraindicaciones

- No utilizar en animales con hipersensibilidad al Metronidazol, derivados nitroimidazólicos o Espiramicina.
 - No administrar en animales severamente debilitados.
 - No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
 - No administrar en animales reproductores.
 - No usar en conjunto a Cloranfenicol o lincosamidas.
-

Precauciones para el operador

- Use guantes para administrar el producto.
 - Lavarse las manos después de la administración del producto.
 - No comer, beber o fumar en el momento de la manipulación y administración del producto.
 - En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Acudir a un centro médico cercano.
 - En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por al menos 15 minutos. En el caso de existir algún tipo de irritación se recomienda acudir al médico.
-

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 30 °C. No refrigerar ni congelar.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Período de resguardo

No aplica.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Registros

Reg. SAG N° 2476-B

Presentación

Estuche con 10 comprimidos.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
